

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada bab ini disajikan mengenai kesimpulan dan saran hasil penelitian tentang tingkat interaksi gangguan lambung (*dispepsia, gastritis dan gastroesophageal reflux disease*) di Klinik Satelit Kalimantan Gresik.

#### **5.1 KESIMPULAN**

Hasil interaksi obat pada *Medscape* menunjukkan bahwa tingkat keparahan yang paling sering terjadi adalah tingkat keparahan *minor* dengan 53 kasus (92,98%). Tingkat keparahan *monitor closely* tercatat sebanyak 3 kasus (5,26%), dan tingkat keparahan *serious* tercatat sebanyak 1 kasus (1,75%). Dengan demikian, total interaksi obat yang tercatat pada *Medscape* adalah 57 kasus. Interaksi obat berdasarkan tingkat keparahan menurut *Drugs.com* menunjukkan tingkat keparahan *minor* sebanyak 187 kasus (70,57%), tingkat keparahan *moderate* sebanyak 73 kasus (27,55%), dan tingkat keparahan *major* sebanyak 5 kasus (1,89%). Dengan demikian, total interaksi obat yang tercatat pada *Drugs.com* adalah 265 kasus.

Secara keseluruhan, dari kedua sumber data ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar interaksi obat pada pasien dengan gangguan lambung dikategorikan sebagai interaksi dengan tingkat keparahan minor. Meski ada beberapa kasus dengan tingkat keparahan sedang hingga serius, namun jumlahnya relatif kecil. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada risiko interaksi obat, mayoritasnya tidak menimbulkan dampak yang sangat serius pada pasien.

## **5.2 SARAN**

Dari hasil penelitian dapat diberikan saran sebagai berikut :

### **5.2.3 Bagi Akademik**

Hasil penelitian ini dharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta menjadi salah satu bacaan bagi peneliti berikutnya khususnya dalam hal kefarmasian, selain itu dapat memperkaya informasi tentang tingkat interaksi obat (*dispepsia, gastritis dan gastroesophageal reflux disease*).

### **5.2.2 Bagi Praktisi**

#### **1. Bagi Profesi farmasi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi mahasiswa DIII Farmasi tentang tingkat interaksi obat gangguan lambung.

#### **2. Bagi Instansi**

Diharap penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan informasi dan memberikan landasan bagi tenaga medis tentang tingkat interaksi obat gangguan lambung.

#### **3. Bagi penelitian selanjutnya**

Diharap dapat melakukan penelitian secara prospektif untuk mengetahui kejadian interaksi yang benar-benar terjadi dan dialami oleh pasien.

