

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa jenis interaksi obat yang paling tinggi di rumah sakit Muhammadiyah Babat adalah interaksi dengan tingkat keparahan moderat sejumlah 30 (81,1%) kejadian, sedangkan tingkat keparahan minor sejumlah (18,9) dan mayor sejumlah 0 (0%).

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran mengenai manajemen terapi pasien hipertensi dengan diabetes melitus.

5.2.2 Bagi Instalasi

Disarankan untuk peran apoteker klinis dalam pemantauan terapi obat, terutama dalam mengevaluasi efektivitas obat pada pasien yang menggunakan obat hipertensi dengan diabetes melitus, dari golongan CCB dan ARB atau golongan lainnya.

5.2.3 Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan penelitian lanjutan dengan populasi dan variabel yang lebih luas, serta mempertimbangkan faktor farmakokinetik dan farmakodinamik.